МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

16.01.2023 № 57

г.Мінск

г.Минск

Об изменении приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. № 412 и от 8 августа 2022 г. № 1044

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в следующие приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

1.1. в приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 апреля 2021 г. № 412 «О проведении вакцинации против COVID-19»:

подпункты 3.3 и 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.3. организацию вакцинации в соответствии с перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 мая 2018 г. № 42 «О профилактических прививках»;

3.4. охват основной (первичной) вакцинацией не менее 70 % от численности населения каждого региона, охват бустерной вакцинацией подлежащих контингентов на уровне не ниже 90 % от вакцинированных основной (первичной) вакцинацией в срок до 29.12.2023;»;

приложения 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение 7 исключить;

1.2. Инструкцию о порядке проведения основной (первичной) и бустерной вакцинации против COVID-19, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2022 г. № 1044, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра по курации.

Министр Д.Л.Пиневич

Приложение 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 16.04.2021 № 412
(в редакции приказа Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
№)

Форма

Сведения о количестве лиц, привитых против COVID-19, по контингентам по состоянию на _____

_____
область, г. Минск, ведомство

№ п/п	Наименование контингента	Численность контингента на 01.01.2023	Количество человек, привитых основной (первичной) вакцинацией на 04.01.2023	Основная (первичная) вакцинация					Бустерная вакцинация							
				Количество привитых			Охват от численности контингента, %		Количество привитых лиц				Охват от численности подлежащего контингента, %			
				вакциной с 2-кратной схемой введения, в т.ч.		вакциной с 1-кратной схемой введения	одной дозой	законченной вакцинацией	бустер-1	бустер-2	бустер-3	бустер-4	бустер-1	бустер-2	бустер-3	бустер-4
				первая доза	вторая доза	одна доза										
1.	Лица 18 лет и старше всего, в т.ч.:															
1.1.	медицинские и фармацевтические работники															

1.2.	работники учреждений социального обслуживания населения															
1.3.	работники учреждений образования															
1.4.	лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания															
1.5.	лица в возрасте 61 год и старше															
1.6.	лица с хроническими заболеваниями, в т.ч.															
1.6.1.	*лица с терминальной стадией хронической болезни почек, получающие лечение почечно-заместительной терапией методами хр.диализа*															
1.6.2.	*лица, находящиеся в листе ожидания трансплантации органа и (или) ткани*															
1.6.3.	*лица, которым проведена трансплантация органа и (или) ткани, в течение года после ее выполнения,*															

	после консультации врача специалиста по иммунологии															
1.7.	другие лица, имеющие риск тяжелого течения заболевания															
1.8.	беременные женщины															
1.9.	работники торговли и общественного питания															
1.10.	работники сферы бытового обслуживания															
1.11.	работники транспортных организаций															
1.12.	работники учреждений культуры и спорта															
1.13.	работники службы ЖКХ, энергообеспечения, водообеспечения															
1.14.	другие профессиональные группы															
1.15.	студенты, учащиеся (ПТУ, ССУЗ, ВУЗ - 18 лет и старше)															
1.16.	прочее население															

2.	Лица 0-17 лет всего, в т.ч.:					X										
2.1.	дети 5-17 лет, в т.ч.					X										
2.1.1.	студенты, учащиеся (ПТУ, ССУЗ, ВУЗ)					X										
2.1.2.	проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания					X										
2.2.	дети 0-4 лет			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	ВСЕГО население *(численность контингента= сумма строк 1+2;*															

Приложение 3
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 16.04.2021 № 412
(в редакции приказа Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
№)

Таблица 1

Сведения о количестве лиц, привитых против COVID-19,
по состоянию на _____
основная (первичная) вакцинация

_____
область, г. Минск, ведомство

Контингент	Численность контингента на 01.01.2023	Количество привитых лиц:			Охват от численности контингента, %	
		вакциной с 2-кратной схемой введения, в т.ч.		вакциной с 1-кратной схемой введения		
		первая доза	вторая доза	одна доза	одной дозой	законченной вакцинацией
5-17 лет						
18 лет и старше						
Итого						

Таблица 2

Сведения о количестве лиц, привитых против COVID-19,
по состоянию на _____
бустерная вакцинация*

_____
область, г. Минск, ведомство

Контингент	Количество человек, привитых основной (первичной) вакцинацией на 04.01.2023	Первый бустер	Второй бустер	Третий бустер	Четвертый бустер	Охват от численности подлежащего контингента, %			
		количество привитых лиц	количество привитых лиц	количество привитых лиц	количество привитых лиц	первым бустером	вторым бустером	третьим бустером	четвертым бустером
5-17 лет									
18 лет и старше									
Итого									

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.08.2022 № 1044
(в редакции приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь №)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения основной (первичной) и бустерной вакцинации против COVID-19

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения основной (первичной) и бустерной вакцинации против COVID-19.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины:

основная (первичная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации в соответствии с инструкцией к иммунобиологическому лекарственному препарату (далее – ИЛП), проводимый пациенту впервые;

бустерная вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, включающий введение одной дозы вакцины, проводимый пациенту через 6 и более месяцев после законченной основной (первичной) или предыдущей бустерной вакцинации.

3. Проведение вакцинации против COVID-19 осуществляется с использованием ИЛП для профилактики коронавирусной инфекции в соответствии с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем).

4. Основная (первичная) вакцинация против COVID-19 может состоять из двух или одной дозы в зависимости от применяемого ИЛП.

5. Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится лицам с 5 лет с использованием любой доступной вакцины для профилактики COVID-19, допустимой к использованию с учетом возраста и показаний (допускается использование компонента 1 или компонента 2 без чередования компонентов для двухкомпонентных вакцин), вне зависимости от типа ИЛП, применяемого для предшествующей вакцинации (основной (первичной) или бустерной);

6. Вакцинация проводится после информирования пациента (а в случаях, установленных законодательством – его законного представителя) об инфекции, против которой проводится прививка,

названии вакцины, наличии противопоказаний, закономерностях и особенностях течения поствакцинального периода и получения согласия в соответствии с законодательством.

Вакцинация может быть проведена после выздоровления пациента, в том числе после перенесенной COVID-19, и (или) завершения изоляции (в случае необходимости).

7. Допускается совместное применение (в один день) вакцины против COVID-19 и иных ИЛП в рамках вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением живых вакцин), если иное не предусмотрено инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем).

8. В случае выявления в ходе вакцинации против COVID-19 (основной (первичной) или бустерной) пациента побочных (нежелательных) реакций на введение вакцины и при отсутствии противопоказаний целесообразно осуществить замену вакцины на вакцину другого типа (при ее наличии).